

কৃষি সমূহ



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, গাজীপুর

Bangladesh Rice Research Institute, Gazipur

Phone: PABX-880-2-49272005-9, 49272010-38, 49272056, Fax: 880-2-49272000
E-mail: brri@brri.gov.bd, brri@yahoo.com Website: www.brri.gov.bd, www.knowledgebank-brri.org

খুর্ণিবাড়ি সিভার্আং পরিবর্তী আমন ফসল রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

(১৫.১০.২০২২)

- WRF মডেল হতে প্রাপ্ত আবহাওয়ার পূর্বীভাস অনুযায়ী আগামী ০৫ (২৫/১০/২০২২ইং-২৯/১০/২০২২ইং) দিন বাংলাদেশের কোন জেলাতেই মাঝারি কিংবা ভারি বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। বরিশাল ও খুলনা বিভাগের কোন-কোন জেলায় খুবই সামান্য কিছু বৃষ্টি হতে পারে।
- ধানের এই অবস্থায় জমিতে সার ও সেচ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ধান আধা পাকা বা পাকার কাছাকাছি থাকলে জমি হতে অতি দুর্বল পানি সরিয়ে ফেলতে হবে।
- সেচ নালা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে ধানের জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে।
- শামা বা ফুল্কা আগাছায় এই সময় ফুল আসে। শামা বা ফুল্কা আগাছা উঠেয়ে ফেলতে হবে।
- খুর্ণিবাড়ির প্রভাবে যদি ধান নুইয়ে পড়ে সম্ভব হলে ৫-৬ টি ধানের গোছা একসাথে রশির সাহায্যে বেঁধে দিয়ে থাঢ়া করে রাখতে হবে এতে ফলনে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং ধান পরিপূর্ণ হবে।
- ধান গাছের বর্তমান বৃক্ষ পর্যায়ে সুগন্ধি জাতে শিষ ব্লাস্ট এবং সংবেদনশীল জাতে (যেমন: ত্রি ধান৪৯, ত্রি ধান৭৫, ত্রি ধান৭৯) লক্ষ্মির গু রোগ দেখা দিতে পারে। আর এ রোগ দু'টি একবার হয়ে গেলে আর দমন করা যায় না। তাই বৃক্ষ কম্বলেই শিষ ব্লাস্ট রোগের জন্য ট্রাইসাইজ্ঞাজল গুপ্তের ছত্রাকনাশক যেমন: টুপার প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৮ গ্রাম ঔষধ ভাল ভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ৭ দিন ব্যবধানে ২ বার বিকাল বেলা স্প্রে করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন স্প্রে করার পরপরই বৃক্ষিতে ঔষধ ধূয়ে না যায়। একই ভাবে লক্ষ্মির গু রোগের জন্য প্রোপিকোনাজল গুরুপর ছত্রাকনাশক যেমন: টিপ্ট রোগ হওয়ার আগেই প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া বাড়ি-বৃক্ষের কারনে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। ধানের ফুল আসার পর এ রোগটি দেখা দিলে ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না।
- কাটা ফসল নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ নিয়ে ঝাড়াই ও মাড়াই করুন।

আবহাওয়া ভিত্তিক ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানে-
এক্সেমেন্টেডোলোজি এন্ড ক্রপ মডেলিং ল্যাব, ত্রি, গাজীপুর